

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Στατιστική

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^v (x_i - \bar{x})^2}{v}} \quad \text{ή} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2}{v}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i x_i^2}{v} - \bar{x}^2}, \quad \text{όπου } v = \sum_{i=1}^k f_i$$

2. Τριγωνομετρία

$$\eta\mu(A \pm B) = \eta\mu A \sin B \pm \sin A \eta\mu B, \quad \sin(A \pm B) = \sin A \cos B \mp \cos A \sin B$$

$$2\eta\mu \sin \beta = \eta\mu(\alpha - \beta) + \eta\mu(\alpha + \beta), \quad 2\sin A \cos B = \sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)$$

$$2\eta\mu \cos \beta = \sin(\alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta), \quad \eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu \cdot \sin \alpha, \quad \sin 2\alpha = \sin^2 \alpha - \eta\mu^2 \alpha$$

$$\eta\mu^2 \alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{2}, \quad \sin 2\alpha = \frac{1 - t^2}{2}$$

$$\eta\mu 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \sin 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad t = \varepsilon \varphi \alpha$$

$$\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}, \quad \eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu \frac{A-B}{2} \sin \frac{A+B}{2}$$

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \eta\mu \frac{B-A}{2} \eta\mu \frac{A+B}{2}$$

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:

	Σε μοίρες	Σε ακτίνια
$\eta\mu x = \eta\mu a$	$x = 360^\circ k + a \quad \text{ή} \quad x = 360^\circ k + 180^\circ - a, \quad k \in \mathbb{Z}$	$x = 2\pi k + a \quad \text{ή} \quad x = 2\pi k + \pi - a, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\sin x = \sin a$	$x = 360^\circ k \pm a, \quad k \in \mathbb{Z}$	$x = 2\pi k \pm a, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\varepsilon \varphi x = \varepsilon \varphi a$	$x = 180^\circ k + a, \quad k \in \mathbb{Z}$	$x = \pi k + a, \quad k \in \mathbb{Z}$

3. Γεωμετρία

Ορθό πρίσμα	$E_\pi = \Pi_\beta \cdot u$	$V = E_\beta \cdot u$
Κανονική Πυραμίδα	$E_\pi = \frac{1}{2} \Pi_\beta \cdot h$	$V = \frac{E_\beta \cdot u}{3}$
Κύλινδρος	$E_\pi = 2\pi R u$	$V = \pi R^2 u$
Κώνος	$E_\pi = \pi R \lambda$	$V = \frac{\pi R^2 u}{3}$
Κόλουρος Κώνος	$E_\pi = \pi(R + \rho)\lambda$	$V = \frac{\pi u}{3}(R^2 + R\rho + \rho^2)$

4. Αναλυτική Γεωμετρία

Απόσταση των σημείων A(x₁,y₁) και B(x₂,y₂): $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Απόσταση του σημείου A(x₁,y₁) από την ευθεία Ax+By+C=0: $d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

Έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, $\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$, $\alpha > \beta$ Εστίες ($\pm\gamma, 0$), Διευθετούσες $x = \pm\frac{\alpha}{\varepsilon}$,

Εκκεντρότητα $\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha}$

5. Παράγωγοι

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$(\eta \mu x)' = \sigma uvx, \quad (\sigma uvx)' = -\eta \mu x, \quad (\varepsilon \varphi x)' = \tau \varepsilon \mu^2 x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

6. Ολοκληρώματα

$$\int \tau \varepsilon \mu x dx = \ln |\tau \varepsilon \mu x + \varepsilon \varphi x| + C \quad \int \sigma \tau \varepsilon \mu x dx = \ln \left| \varepsilon \varphi \frac{x}{2} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\alpha^2 - x^2}} = \tau \xi \eta \mu \frac{x}{\alpha} + C \quad \int \frac{dx}{\alpha^2 + x^2} = \frac{1}{\alpha} \tau \xi \varepsilon \varphi \frac{x}{\alpha} + C$$

7. Απλός τόκος: $T = \frac{K \cdot E \cdot X}{100}$