



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
35^η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης"
3 Μαρτίου 2018

Θέματα μεγάλων τάξεων

Ενδεικτικές λύσεις

Πρόβλημα 1

Θεωρούμε την ακολουθία (x_n) , $n \in \mathbb{N}^*$, που ορίζεται αναδρομικά από τη σχέση $x_{n+1} = 3x_n^3 + x_n$, με $x_1 = \frac{a}{b}$, όπου a, b είναι θετικοί ακέραιοι και ο 3 δεν διαιρεί τον ακέραιο b . Αν για κάποιο θετικό ακέραιο m ο x_m είναι τέλειο τετράγωνο ρητού αριθμού, να αποδείξετε ότι και ο x_1 είναι τέλειο τετράγωνο ρητού αριθμού.

Λύση

Θα δείξουμε ότι αν ο x_{n+1} είναι τέλειο τετράγωνο ρητού, τότε και ο x_n είναι τέλειο τετράγωνο ρητού, οπότε επαγωγικά θα πάρουμε το ζητούμενο.

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αφού ο 3 δεν διαιρεί τον b , δεν θα διαιρεί κανέναν παρονομαστή όρου της ακολουθίας.

Από την αναδρομική σχέση έχουμε $x_m = 3x_{m-1}^3 + x_{m-1}$. Θέτουμε $x_{m-1} = \frac{p}{q}$ όπου ο q

δεν διαιρείται με 3 (*) και $(p, q) = 1$. Τότε

$$x_m = 3x_{m-1}^3 + x_{m-1} = \frac{3p^3 + pq^2}{q^3} = \frac{p(3p^2 + q^2)}{q^3}.$$

Αφού $(p, q) = 1$, αυτή είναι η ανάγωγη μορφή του x_m . Πράγματι, οι αριθμοί

$p(3p^2 + q^2)$, q^3 είναι πρώτοι μεταξύ τους, αφού αν ένας πρώτος s διαιρεί και τους δύο, τότε $s | q^3 \Rightarrow s | q$ και $s | 3p^2 + q^2$ τότε $s | 3p^2$. Αφού όμως s δεν διαιρεί τον p , θα έχουμε $s | 3 \Rightarrow s = 3$, $3 | q$, άτοπο από την (*).

Από την εκφώνηση ο x_m είναι τέλειο τετράγωνο ρητού, οπότε θα πρέπει ο αριθμητής και ο παρονομαστής να είναι τέλεια τετράγωνα.

Για να είναι ο παρονομαστής τέλειο τετράγωνο, πρέπει ο q να είναι τέλειο τετράγωνο, έστω $q = a^2$. Για να είναι ο αριθμητής τέλειο τετράγωνο, έστω $p(3p^2 + q^2) = \kappa^2$, πρέπει και οι δύο παράγοντες να είναι τέλεια τετράγωνα αφού είναι σχετικά πρώτοι.

Πράγματι, αν ένας πρώτος t διαιρεί τον p και τον $3p^2 + q^2$, τότε $t | q$, που είναι άτοπο αφού $(p, q) = 1$.

Έτσι $p = b^2$, $2p^2 + q^2 = c^2$. Επομένως $x_{m-1} = \frac{p}{q} = \frac{b^2}{a^2}$, άρα ο x_{m-1} είναι τέλειο

τετράγωνο ρητού.


Όμοια τώρα, πηγαίνοντας προς τα πίσω δείχνουμε ότι ο x_{m-2} είναι τέλειο τετράγωνο ρητού, κ.ο.κ μέχρι να φτάσουμε στον x_1 .

Πρόβλημα 2

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma < B\Gamma$ και ο περιγεγραμμένος κύκλος του c με κέντρο O και ακτίνα R . Στα μικρά τόξα $A\Gamma$ και AB θεωρούμε τα σημεία Δ και E αντίστοιχα. Έστω K είναι το σημείο τομής των $B\Delta$, ΓE και N είναι το δεύτερο κοινό σημείο των περιγεγραμμένων κύκλων των τριγώνων BKE , έστω c_1 , και $\Gamma K\Delta$ (έστω c_2). Να αποδείξετε ότι: τα σημεία A, K, N είναι συνευθειακά, αν και μόνο αν, το σημείο K ανήκει στη συμμετροδιάμεσο του τριγώνου $AB\Gamma$, που αντιστοιχεί στην κορυφή A .

Σημείωση: Συμμετροδιάμεσος τριγώνου είναι η συμμετρική ευθεία της διαμέσου ως προς τη διχοτόμο που περνάει από την ίδια κορυφή με τη διάμεσο

Λύση



Σχήμα 1

1^{ος} Τρόπος

Έστω K το σημείο τομής των $B\Delta$, ΓE και N το δεύτερο κοινό σημείο των κύκλων c_1 , c_2 . Έστω ακόμη Z το σημείο τομής των εφαπτομένων στα σημεία B, Γ του κύκλου c . Θα αποδείξουμε ότι τα σημεία K, N, Z είναι συνευθειακά.

Σημειώνουμε με T τη τομή της BZ με τον c_1 και P τη τομή της $Z\Gamma$ με τον c_2 , τότε θα ισχύουν οι παρακάτω ισότητες γωνιών:

$$\hat{E}_1 = \hat{T}_1 : (\text{εγγεγραμμένες στο κύκλο } c_1 \text{ και βαίνουν στο ίδιο τόξο } BK)$$

$$\hat{E}_1 = \hat{B}_1 : (\text{η } \hat{B}_1 \text{ δημιουργείτε από τη χορδή } B\Gamma \text{ και την εφαπτομένη } BZ \text{ στο κύκλο } c)$$

$$\hat{\Delta}_1 = \hat{P}_1 : (\text{εγγεγραμμένες στο κύκλο } c_2 \text{ και βαίνουν στο ίδιο τόξο } \Gamma K)$$

$$\hat{\Delta}_1 = \hat{\Gamma}_1 : (\text{η } \hat{\Gamma}_1 \text{ είναι γωνία της χορδής } B\Gamma \text{ και την εφαπτομένης } \Gamma Z \text{ στο κύκλο } c)$$

$\hat{B}_1 = \hat{\Gamma}_1$: (οι ZB και $Z\Gamma$ είναι εφαπτόμενες στο κύκλο c)

Από τις παραπάνω ισότητες προκύπτουν τα εξής:

$\hat{B}_1 = \hat{T}_1$, άρα $KT // B\Gamma$ και $\hat{\Gamma}_1 = \hat{P}_1$, άρα $KP // B\Gamma$.

Επομένως το τετράπλευρο $B\Gamma PT$ είναι ισοσκελές τραπέζιο και κατά συνέπεια εγγράψιμο σε κύκλο (έστω c_3).

Άρα η κοινή χορδή KN των κύκλων c_1 και c_2 θα διέρχεται από το ριζικό κέντρο Z των κύκλων c_1, c_2, c_3 .

Αν τώρα υποθέσουμε ότι τα σημεία A, K, N είναι συνευθειακά, τότε (επειδή και τα σημεία K, N, T είναι συνευθειακά) συμπεραίνουμε ότι τα σημεία A, K, N, T είναι συνευθειακά, δηλαδή τα σημεία A, K, N θα ανήκουν στη συμμετροδιάμεσο AT .

Αντίστροφα τώρα, αν υποθέσουμε ότι το σημείο K ανήκει στη συμμετροδιάμεσο AT , τότε τα σημεία A, K, T θα είναι συνευθειακά. Οπότε (επειδή και τα σημεία K, N, T είναι συνευθειακά) συμπεραίνουμε ότι τα σημεία A, K, N είναι συνευθειακά.


2^{ος} Τρόπος

Έστω K το σημείο τομής των $B\Delta$, ΓE και N το δεύτερο κοινό σημείο των κύκλων c_1, c_2 . Έστω ακόμη Z το σημείο τομής των εφαπτομένων στα σημεία B, Γ του κύκλου c . Αν H είναι το σημείο τομής των EB και $\Delta\Gamma$, θα αποδείξουμε ότι τα σημεία K, N, Z, H είναι συνευθειακά.

Από την εφαρμογή του θεωρήματος Pascal στο εκφυλισμένο εξάγωνο $BB\Gamma\Delta E$, συμπεραίνουμε ότι τα σημεία H, K, Z είναι συνευθειακά.

Το σημείο H έχει την ίδια δύναμη ως προς το κύκλο c . Δηλ. $HE \cdot HB = H\Delta \cdot H\Gamma$.

Άρα τα σημεία K, N, H είναι συνευθειακά. Οπότε τα σημεία K, N, Z, H είναι συνευθειακά.



Σχήμα 2

Αν τώρα υποθέσουμε ότι τα σημεία A, K, N είναι συνευθειακά, το σημείο K θα ανήκει στην συμμετροδιάμεσο AZ .

Αντίστροφα, αν το K ανήκει στην συμμετροδιάμεσο AZ τότε τα σημεία A, K, N είναι συνευθειακά.

Πρόβλημα 3

(α) Δίνονται οι φυσικοί αριθμοί n, m με $n < m$ και διακεκριμένοι πραγματικοί αριθμοί a_1, \dots, a_m . Να βρεθούν όλα τα πολυώνυμα P με πραγματικούς συντελεστές, βαθμού το πολύ n , για τα οποία ισχύει η ισότητα

$$|P(a_i) - P(a_j)| = |a_i - a_j|, \quad (1)$$

για κάθε i, j με $1 \leq i < j \leq m$.

(β) Δίνονται φυσικοί αριθμοί $m, n \geq 2$ με $n < m$. Να εξετάσετε αν υπάρχει πολυώνυμο Q με πραγματικούς συντελεστές βαθμού n καθώς και διακεκριμένοι πραγματικοί αριθμοί a_1, \dots, a_m , τέτοιοι ώστε

$$|Q(a_i) - Q(a_j)| < |a_i - a_j|,$$

για κάθε i, j με $1 \leq i < j \leq m$.

Λύση

(α) Θα ασχοληθούμε πρώτα με το ερώτημα (α). Λόγω της συμμετρίας υποθέτουμε ότι $a_1 > a_2 > \dots > a_m$ και για ευκολία θέτουμε $d_i = P(a_i) - P(a_{i+1})$. Τότε λόγω της (1) έχουμε:

$$\begin{aligned} & |d_1| + |d_2| + \dots + |d_{m-1}| = \\ & = |P(a_1) - P(a_2)| + |P(a_2) - P(a_3)| + \dots + |P(a_{m-1}) - P(a_m)| \\ & = |a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_{m-1} - a_m| \\ & = a_1 - a_2 + a_2 - a_3 + \dots + a_{m-1} - a_m \\ & = a_1 - a_m = |a_1 - a_m| \\ & = |P(a_1) - P(a_m)| = |P(a_1) - P(a_2) + P(a_2) - P(a_3) + \dots + P(a_{m-1}) - P(a_m)| \\ & = |d_1 + d_2 + \dots + d_{m-1}| \end{aligned}$$

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί d_1, d_2, \dots, d_{m-1} είναι ομόσημοι. Οπότε έχουμε δύο περιπτώσεις.

1^η περίπτωση: Όλοι οι d_1, d_2, \dots, d_{m-1} είναι θετικοί. Είναι Τότε από την (1) έχουμε ότι $P(a_1) - P(a_2) = a_1 - a_2 \Rightarrow P(a_1) - a_1 = P(a_2) - a_2$. Όμοια

$P(a_2) - a_2 = P(a_3) - a_3, \dots, P(a_{m-1}) - a_{m-1} = P(a_m) - a_m$. Έπεται ότι

$$P(a_1) - a_1 = P(a_2) - a_2 = \dots = P(a_m) - a_m = k \quad (2)$$

Αυτό σημαίνει ότι το πολυώνυμο $Q(x) = P(x) - x - k$ που είναι βαθμού το πολύ n ,

έχει $m > n$ διακεκριμένες ρίζες (τα $a_1 > a_2 > \dots > a_m$). Έπεται ότι το $Q(x)$ είναι το μηδενικό πολυώνυμο, οπότε $P(x) = x + k$, όπου $k \in \mathbb{R}$.

2^η περίπτωση: Όλοι οι d_1, d_2, \dots, d_{m-1} είναι αρνητικοί. Τότε από την (1) έχουμε ότι $-P(a_1) + P(a_2) = a_1 - a_2 \Rightarrow P(a_1) + a_1 = P(a_2) + a_2$. Επομένως

$$P(a_1) + a_1 = P(a_2) + a_2 = \dots = P(a_m) + a_m = \lambda \quad (3)$$

Αυτό σημαίνει ότι το πολυώνυμο $R(x) = P(x) + x - \lambda$ που είναι βαθμού το πολύ n , έχει $m > n$ διακεκριμένες ρίζες (τα $a_1 > a_2 > \dots > a_m$). Έπεται ότι το $R(x)$ είναι το μηδενικό πολυώνυμο, οπότε $P(x) = -x + \lambda$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

Επομένως δύο πολυώνυμα, το $P(x) = x + k$ και το $P(x) = -x + \lambda$ είναι τα μόνα που ικανοποιούν τις συνθήκες του προβλήματος.

2^{ος} τρόπος: Ας υποθέσουμε ότι $m \geq 3$ και ότι υπάρχουν $p, q, r \in \{a_1, \dots, a_m\}$ ώστε να ισχύει:

$$P(p) - P(q) = p - q, \quad P(p) - P(r) = r - p.$$

Με αφαίρεση κατά μέλη των παραπάνω παίρνουμε ότι

$$P(r) - P(q) = 2p - q - r. \quad (4)$$

Όμως από την συνθήκη της εκφώνησης έχουμε ότι $P(r) - P(q) = r - q$ ή $P(r) - P(q) = q - r$. Στην πρώτη περίπτωση η (4) γίνεται $2r = 2p \Rightarrow r = p$, άτοπο αφού οι $p, r \in \{a_1, \dots, a_m\}$ που είναι διακεκριμένοι. Όμοια, αν $P(r) - P(q) = q - r$ τότε η (4) δίνει $q = p$, πάλι άτοπο.

Αυτό σημαίνει ότι είτε $m < 3$, είτε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι $p, q, r \in \{a_1, \dots, a_m\}$.

1^η περίπτωση: Αν $m < 3$, τότε $n = 1$ ή $n = 0$. Προφανώς η $n = 0$ απορρίπτεται αφού κανένα σταθερό πολυώνυμο δεν ικανοποιεί. Η $n = 1$ δίνει $P(x) = ax + b$, οπότε πρέπει

$$|a \cdot a_i + b - a \cdot a_j - b| = |a_i - a_j| \Leftrightarrow |a| = 1$$

οπότε $P(x) = x + b$, ή $P(x) = -x + b$.

2^η περίπτωση: Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι $p, q, r \in \{a_1, \dots, a_m\}$, τότε είτε

$P(a_1) - a_1 = P(a_2) - a_2 = \dots = P(a_m) - a_m = k$, οπότε οδηγούμαστε στην 1^η περίπτωση που είδαμε στον 1^ο τρόπο, είτε

$P(a_1) + a_1 = P(a_2) + a_2 = \dots = P(a_m) + a_m = \lambda$, οπότε οδηγούμαστε στην 2^η περίπτωση που είδαμε στον 1^ο τρόπο.

(β) Θα δείξουμε ότι αν $Q(x) = x^n$ και $|a_i| < \frac{1}{n}$ για κάθε $1 \leq i \leq m$ τότε ισχύει η

ζητούμενη ανισότητα. Πράγματι,

$$|Q(a_i) - Q(a_j)| = |a_i^n - a_j^n| = |a_i - a_j| \cdot |a_i^{n-1} + a_i^{n-2}a_j + \dots + a_j^{n-1}| \quad (1)$$

και

$$|a_i^{n-1} + a_i^{n-2}a_j + \dots + a_j^{n-1}| \leq |a_i^{n-1}| + |a_i^{n-2}a_j| + \dots + |a_j^{n-1}| < \frac{1}{n^{n-1}} + \frac{1}{n^{n-1}} + \dots + \frac{1}{n^{n-1}} = \frac{n}{n^{n-1}} < 1$$

οπότε από την (1) έχουμε $|P(a_i) - P(a_j)| < |a_i - a_j|$.


Σημείωση: Στο δεύτερο ερώτημα υπάρχουν και άλλες πιθανές κατασκευές που μπορεί να γίνουν.

Πρόβλημα 4.

Θεωρούμε n σημεία στο επίπεδο, $n \geq 4$, ανά τρία μη συνευθειακά. Ονομάζουμε $A(n)$ το πλήθος των παραλληλογράμμων εμβαδού 1 που σχηματίζονται με κορυφές αυτά τα σημεία. Να αποδείξετε ότι $A(n) \leq \frac{n^2 - 3n}{4}$, για κάθε $n \geq 4$.

Λύση

Σταθεροποιούμε μία διεύθυνση \vec{u} στο επίπεδο. Σε κάθε ευθεία παράλληλη σε αυτή τη διεύθυνση μπορεί να έχουμε το πολύ δύο σημεία. Ας υποθέσουμε ότι σε αυτή υπάρχουν k ζεύγη σημείων για αυτή τη διεύθυνση. Τότε όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (για $k=3$), σχηματίζονται το πολύ $k-1$ παραλληλόγραμμα εμβαδού 1 με αυτά τα k ζεύγη σημείων.



$k=3$, σχηματίζονται 2 παραλληλόγραμμα

Διεύθυνση \vec{u}


Σχήμα 3

Επομένως σε μία διεύθυνση με k ζεύγη σημείων, σχηματίζονται το πολύ $k-1$ παραλληλόγραμμα εμβαδού 1. Επομένως, αν αθροίσουμε τα παραλληλόγραμμα σε όλες τις διευθύνσεις, θα πάρουμε

$$\sum (k-1) = \left(\sum k \right) - s,$$

όπου s είναι το συνολικό πλήθος των διευθύνσεων στις οποίες βρίσκονται σημεία. Το άθροισμα όμως $\left(\sum k \right)$ είναι το άθροισμα όλων των τμημάτων, που είναι $\binom{n}{2}$.

Επομένως, το πλήθος των παραλληλογράμμων εμβαδού 1 είναι το $\binom{n}{2} - s$. Αλλά με αυτό τον τρόπο μετρήσαμε κάθε παραλληλόγραμμο δύο φορές. Μία φορά για την διεύθυνση $\vec{\alpha}$ και μία φορά για τη διεύθυνση $\vec{\beta}$, όπως φαίνεται στο σχήμα:




Σχήμα 4

Επομένως το συνολικό πλήθος των παραλληλογράμμων εμβαδού 1 είναι το πολύ

$$\frac{\binom{n}{2} - s}{2}.$$

Θα δείξουμε τώρα ότι αν έχουμε $n \geq 4$ σημεία στο επίπεδο, ανά τρία μη συνευθειακά, τότε το πλήθος των διευθύνσεων είναι $s \geq n$. Πράγματι ας πάρουμε τρία γειτονικά σημεία A, B, Γ (σε κυρτή θέση) όπως στο σχήμα:



Σχήμα 5

Το σημείο A συνδέεται με $n-1$ τμήματα με τα υπόλοιπα σημεία. Όλα αυτά τα τμήμα έχουν κοινό σημείο το A, οπότε ορίζουν $n-1$ διαφορετικές διευθύνσεις. Επιπλέον το τμήμα BΓ δεν είναι παράλληλο σε κανένα από αυτά τα τμήματα, αφού τα τέμνει όλα, άρα ορίζει μία ακόμη διεύθυνση. Επομένως έχουμε τουλάχιστον $n-1+1 = n$ διαφορετικές διευθύνσεις, οπότε το πλήθος των παραλληλογράμμων είναι το πολύ

$$\frac{\binom{n}{2} - n}{2} = \frac{n^2 - 3n}{4}.$$